


Alergické reakcie

Alergická reakcia môže byť spôsobená jedlom, liekmi, uštipnutím hmyzom, peľom či inými látkami. Hoci väčšina alergických reakcií nie je závažná, ťažké reakcie môžu ohroziť život a vyžadujú okamžitú lekársku pomoc.

Znaky a príznaky


Mierna alergická reakcia:

- svrbenie kože, hrdla, ústnej dutiny,
- upchatý nos, opuchnutá sliznica, hlieny,
- svrbenie a slzenie očí,
- začervenanie kože, možný výskyt fľakov, vyrážky,
- kýchanie,
- mierny opuch.



Závažná alergická reakcia:

- opuch tváre či ústnej dutiny,
- ťažkosti s prehĺtaním, s rečou,
- ťažkosti s dýchaním, pískanie pri dýchaní,
- bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie alebo hnačky,
- závrate, mdloby, bezvedomie.



Čo robiť ?

1. Kontaktujte lekára, ak má dieťa príznaky viac ako „mierne“, alebo ak vás jeho alergická reakcia znepokojuje.



2. Ak má dieťa príznaky miernej alergickej reakcie po prvý raz, kontaktujte lekára. Ak je to opakované, podajte mu lekárom predpísané antihistaminikum.



3. Ak má dieťa príznaky ťažkej alergickej reakcie a vy máte adrenalin v injekčnej podobe, okamžite ho podľa inštrukcií použite a volajte rýchlu zdravotnú pomoc.



Kontaktujte pohotovosť, ak:

- má dieťa príznaky ťažkej alergickej reakcie,
- dieťa bolo vystavené jedlu alebo látke, ktorá v minulosti spôsobila ťažkú reakciu,
- dieťaťu bol injekčne podaný adrenalin.



Myslite na prevenciu!

Zabráňte kontaktu (ak je to možné, minimalizujte kontakt) s látkami, na ktoré je dieťa alergické. Majte vždy poruke antihistaminový liek. Ak má dieťa ťažkú alergiu, uistite sa, že lekárom predpísaný injekčný adrenalin je neustále v blízkosti dieťaťa a že vy, opatrojúca osoba, resp. i dieťa (ak je dosť veľké), viete, ako danú injekciu použiť.

Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie účely. Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou, liečbou a odborným poradenstvom sa obráťte na svojho detského lekára.